

BOROGYN[®]

vaginální čípky



SLOŽENÍ:

Jeden čípek obsahuje: kyselina boritá, polykarbofil, kyselina mléčná, tokoferyl-acetát, vitamín A palmitát, kyselina 10-beta-glycyrrhethinová, tea tree olej, fosfatidylcholin, semisyntetické triglyceridy.

POPIS:

Borogyn[®] vaginální čípky je zdravotnický prostředek, který pomáhá obnovit přirozenou vaginální obranyschopnost. Obsahuje kyselinu boritou, kyselinu mléčnou a polykarbofil a pomáhá odstraňovat příznaky způsobené nevyváženým vaginálním pH a endogenní bakteriální flórou. Kyselina mléčná, která je běžně přítomná v pochvě, podporuje okamžitou úpravu pH a usnadňuje přirozenou obnovu křehkého vulvovaginálního ekosystému. Kyselina boritá díky svému přetrvávání ve vaginálním ekosystému dlouhodobě podporuje snížení vaginálního pH. Polykarbofil je po navázání na poševní hlen schopen nepřetržitě uvolňovat ionty H⁺, které pomáhají snižovat pH poševního prostředí.

INDIKACE:

Přípravek Borogyn[®] vaginální čípky se používá při prevenci a léčbě vaginálních onemocnění, včetně mykotických. Pomáhá zmírňovat podráždění, pálení a svědění.

DÁVKOVÁNÍ:

Zavádějte jeden čípek do pochvy denně, nejlépe večer před spaním, po dobu 5–7 dní, po menstruaci nebo podle doporučení lékaře.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

- Poševní oblast důkladně omyjte (nejlépe vnějším i vnitřním vaginálním výplachem).
- Otevřete balení, řádně si umyjte ruce a vyjměte jeden čípek z blistry.
- Čípek jemně zaveďte hluboko do pochvy, nejlépe v poloze vleže na zádech, aby nedošlo k nechtěnému vyklouznutí čípku z pochvy.

PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ:

Balení uchovávejte pečlivě uzavřené na suchém místě, při teplotě od 5 °C do 25 °C. Chraňte před světlem a zdroji tepla.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:

Známa přecitlivělost na kteroukoli ze složek.

UPOZORNĚNÍ:

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Nepolykejte. Nepoužívejte, pokud je obal poškozený. Nepoužívejte přípravek po uplynutí data expirace. Datum expirace se vztahuje na neotevřený a správně uchovávaný přípravek. Nepoužívejte přípravek v případě vaginálních lézí a poranění. Nepoužívejte přípravek během menstruace. Nepřekračujte doporučené dávkování bez porady s lékařem. Používání přípravku, zejména dlouhodobé, může vést ke vzniku přecitlivělosti. V takovém případě léčbu ukončete a o vhodné léčbě se poraďte se svým lékařem. Je důležité informovat lékaře nebo lékárníka o všech nežádoucích účincích, které nejsou uvedené v tomto návodu k použití.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ:

V průběhu těhotenství, kojení a u dětí je třeba použití čípků omezit pouze na nezbytně nutné případy a používat je pod přímou kontrolou lékaře. V případě neporušené panenské blány se před použitím poraďte se svým gynekologem o konkrétních podmínkách použití. Přípravek je určený k jednorázovému použití. V případě nechtěného vyklouznutí čípku z pochvy jej nezávadějte znovu.

BALENÍ:

Krabička se 2 blistry, obsahujícími celkem 10 vaginálních čípků, 2 g/čípek.




výrobce:

Gruppo Fatmaimpresa srl
Via Cipro, 1 - 25124 Bresscia, Itálie
www.fatmaimpresa.it

Distributor pro ČR a SR: Akacia Group, s.r.o.
Na Farkáně 1136/17, 150 00 Praha 5, Česká republika



Zdravotnický prostředek nevyhazujte do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékaře, jak naložit se zdravotnickými prostředky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.



FT.CE.23.18.F00 Rev. del 29/10/2021